

VOTRE FUMIER VAUT DE L'OR !

En couvrant au champ, gardez ses éléments



**Fumier BV
départ stabulation**

**Fumier BV
Pratique usuelle : au
champ sans couverture**

**Fumier BV
couvert par
bâche**

% Matière Sèche :	24.7 % MS	18.7 % MS	20.7 % MS
Azote ammoniacal N-NH4 (kg/t) :	0.49 kg/t NH4	0.26 kg/t NH4	0.27 kg/t NH4
Azote organique N (kg/t) :	6.52 kg/t N	5.37 kg/t N	6.09 kg/t N
Rapport C/N	18.12	14.35	14.25
Phosphore P (kg/t)	2.1 kg/t P	1.9 kg/t P	2.48 kg/t P
Potasse K (kg/t)	8.6 kg/t K	7.5 kg/t K	12.3 kg/t K

Références : 7 fermes (bovins viande) - 2023-2025
Echantillon insuffisant pour être significatif

Tendances observées :

Encourageantes ! ... et ... à consolider !

- **Conservation du CARBONE** : La perte plus faible de l'élément C avec la bâche s'explique en partie par un assèchement du tas et donc un ralentissement des processus biologiques qui consomment le carbone,
- **Maintien des ELEMENTS N, P et K des fumiers par la couverture** : La bâche agit comme protection et participe à limiter les pertes par volatilisation et lessivage.

